



## Zenaida macroura ou Tourterelle triste ou Tourterelle de la Caroline



La Tourterelle triste ou Tourterelle de la Caroline (*Zenaida macroura*) est une espèce d'oiseau de la famille des Columbidae dont la répartition géographique va de l'Amérique centrale au sud du Canada et inclut une partie des Caraïbes. Les individus situés au nord de cette zone migrent vers le sud lorsque les températures descendent au-dessous de 12 degrés Celsius.

Son habitat comprend des environnements ouverts et semi-ouverts, incluant les régions agricoles et urbaines. L'espèce s'est adaptée aux zones fortement modifiées par l'homme. La population totale est estimée à 130 millions d'individus, ce qui fait de cette espèce une des plus communes d'Amérique du Nord. Son chant plaintif « wou-ou-ou-ou » de même que le sifflement de ses ailes à l'envol sont entendus fréquemment dans son aire de répartition. Cet oiseau est chassé dans certaines régions en tant que gibier. C'est un oiseau rapide, capable de faire des pointes de 88 km/h en vol.

La Tourterelle triste a une livrée grise et brune. Le mâle et la femelle ont la même apparence. L'espèce est généralement monogame. Une nichée est habituellement constituée de deux jeunes. L'espèce est prolifique, on peut compter jusqu'à six nichées sur une année. Les deux parents s'occupent des jeunes. Les Tourterelles tristes se nourrissent principalement de graines de plantes indigènes et introduites.

La Tourterelle triste occupe plusieurs habitats dont les zones urbaines, les fermes, les prairies et les milieux légèrement boisés. Elle évite les marais et les forêts denses. Elle niche dans les arbres de plusieurs grandes villes comme New York, Chicago et Atlanta ainsi que dans les forêts des Appalaches et des montagnes Rocheuses.

Cette espèce se complait dans les milieux altérés par les humains. Les colons et immigrants ont défriché les forêts qui recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord, ce qui créa de nouveaux habitats pour la Tourterelle triste.

La migration printanière vers le nord se déroule de la fin mars à mai tandis que la migration automnale vers le sud a lieu de la fin août jusqu'à novembre. Les individus du Canada migrent sur les plus longues distances, leur aire d'hivernage se trouvant probablement au Mexique ou plus au sud. Ceux qui nichent plus au sud sont relativement sédentaires avec des migrations partielles. Au sud de leur aire de répartition, les Tourterelles tristes sont résidentes.

Puisqu'il s'agit d'une espèce gibier, environ 45 millions de Tourterelles tristes sont tuées chaque année par des chasseurs.

**Catégorie actuelle UICN pour la Liste Rouge :** Préoccupation mineure





**TOURTERELLE TRISTE**  
*Zenaida macroura*




Ordre : Columbiformes  
Famille : Columbidae

**Biométrie :**

Taille : 23 à 34 cm  
Envergure : 37 à 45 cm  
Poids : 86 à 170 gr

**Longévité :** 19 ans

**Statut de conservation IUCN :**



**Distribution :**



**Synonymes :** Mourning Dove (en), Tortora lamentosa americana (it), Paloma Lúgubre (es), Carolinataube (de), Treurduif (nl)